



General | | Actualitzat el 07/06/2022 a les 06:28

«El meu fill té varius al penis. És normal?»

Quines són les patologies testiculars més freqüents durant l'adolescència?

[inicicentrareport]"El meu fill té com una mena de varius al penis. És normal", "El meu fill té la **bossa dels testicles molt inflada** i es queixa de dolor a la nit. Què pot ser?". Dubtes com aquests poden ser resolts al següent article.

La **Dra. Laura Burgos**, cirurgiana pediàtrica especialitzada en urologia pediàtrica de la Clínica ROC, ens explica quines són les patologies testiculars freqüents en la infància i en especial durant l'adolescència perquè puguem detectar el problema a casa i fer un seguiment amb un/a especialista.

Mentre que la pregunta més freqüent en nadons és la criptorquídia (absència de testicle a la bossa escrotal) i a partir dels 3 anys la més habitual és la fimosi, durant l'etapa de la pubertat hi ha dos principals problemes que no són tan coneguts popularment però que pot ser útil conèixer: **les hidroceles i les varicoceles**.

Segons ens explica la doctora, les hidroceles és l'acumulació de líquid a l'escrot. Mentre que el noi està estirat al llit, durant la nit, aquest líquid passa a la cavitat abdominal i per tant, la hidrocele és mínima o inexistent. Però durant el dia, i a causa de la comunicació persistent, **el líquid baixa a la zona escrotal i la hidrocele es fa més evident**. Aquest mateix mecanisme és el responsable de les hernies inguinals en l'edat pediàtrica.

I les varicoceles? Doncs és la dilatació (augment de mida) de les venes del testicle i visualment són similars a les varius de les cames. Això és causat per un **mal funcionament de les vàlvules de les venes** que no permeten el flux sanguini adequat, es dilaten i la sang queda acumulada formant varius.

Les varicoceles apareixen habitualment durant la preadolescència i adolescència i normalment afecta el testicle esquerre, a causa de la posició de la vena testicular esquerra. És més freqüent en infants alts i prims. Tot i que pot ser indolor, davant de temperatures elevades o estar **força temps caminant o a peu dret** pot provocar-los punxades.

Per tal que la funció hormonal i les funcions dels testicles es desenvolupi amb normalitat cal estar 2 graus per sota de la temperatura corporal. La doctora destaca que cal consultar amb un/a especialista, en especial si detectem criptorquídia.[ficientrareport]