



General | | Actualitzat el 13/07/2022 a les 08:00

# Brot de gastroenteritis: tot el que has de saber

*Per què són freqüents a l'estiu? Quins són els senyals d'alarma? Com podem prevenir-les?*

[inicentrareport]En les últimes setmanes s'han disparat els casos de **gastroenteritis en infants**. Alguns han acabat amb ingressos tot i que la gran majoria s'acaben resolent en qüestió de dies i sense complicacions.

[GotaVerdaPle] Aquesta és una infecció força **freqüent a l'estiu** per l'augment de la temperatura, que afavoreix la degradació dels aliments, i resulta més fàcil que es pugui trencar la cadena del fred dels mateixos. Un altre factor fonamental és el contacte més gran en aquesta època amb l'aigua, que si està contaminada pot produir el quadre i afavorir-ne la propagació.

[GotaVerdaPle] **Què són les gastroenteritis?** Les gastroenteritis suposen una inflamació de la mucosa de l'estómac i sobretot de l'intestí. Habitualment són d'origen infecciosos, és a dir, que fonamentalment estan ocasionades per virus i per bacteris.

[GotaVerdaPle] **Quins són els símptomes?** Les **gastroenteritis víriques** es manifesten a través de diarrees, dolor abdominal i vòmits. Solen ser normalment benignes i en aquest cas cal reposar líquids i ingerir dietes toves.

També és possible que hi pugui haver febre, ja que parlem d'agents infecciosos. Relacionat amb alguns patògens concrets que produeixen quadres anomenats **enteroinvasius** poden provocar sang i moc a la femta.

En el cas de les **gastroenteritis bacterianes**, als anteriors símptomes se sol sumar la febre i en els casos més greus pot anar lligat a ingrés hospitalari. La reposició de líquids i l'aplicació, a vegades, d'antibiòtics són els tractaments seguits.

[GotaVerdaPle] **Tractament i senyals d'alerta.** Generalment, els quadres de gastroenteritis els hem de passar a casa procurant ingerir líquids per mantenir la hidratació. En cas de dificultats per tolerar-los, fer-ho en poques quantitats però constant. Si hi ha febre, es pot fer ús d'antitèrmics per controlar-la.

Convé consultar la clínica amb una professional de la salut en aquells casos en què detectem que poden haver-hi complicacions. Sobretot en el cas d'infants que puguin tenir signes de deshidratació, com sequedat de la pell i de les mucoses, orines més fosques, o fins i tot cefalea, amb impossibilitat per a una adequada ingesta de líquids ja sigui per vòmits o per incapacitat per fer-ho.

Un altre signe que ens ha d'alertar és la febre alta sostinguda o que no respon bé a antitèrmics perquè, a més, afavoreix una pèrdua més gran de líquids. També pot suposar pas d'agents infecciosos a la sang.

[GotaVerdaPle] **Podem prevenir-les?** Hi ha una sèrie de mesures que poden evitar-les com extreure la higiene de mans tant en el contacte amb altres persones com en la manipulació



---

d'aliments. Cal rentar molt bé fruites, verdures i hortalisses abans de consumir-les.

Per altra banda, és important vetllar perquè no es trenqui la cadena del fred i transportem els aliments en recipients adequats després de fer una compra o en cas d'algun desplaçament, molt comú a l'època estiuenca.

Finalment, s'ha d'evitar el contacte amb aigües potencialment contaminades, no s'ha de beure aigua no potable i advertir les criatures que evitin empassar aigua a les piscines.  
[ficientreport]