



General | | Actualitzat el 09/09/2020 a les 12:10

Motius de consulta durant l'embaràs

Totes les situacions per demanar a un llevador/a o bé a un metge o metgessa

[inici centrareport] Durant l'embaràs, es poden produir una sèrie de canvis que poden fer-nos preocupar. Segons explica la llevadora i divulgadora Laia Casadevall, és normal sentir-se d'aquesta manera, però quan la por s'apodera dels pensaments deixa de ser normal i es pot convertir en contraproductiu.

Les següents són una sèrie de recomanacions publicades pel Departament de Salut, on s'indica que durant l'embaràs poden produir-se una sèrie de situacions que no indiquen que estigui passant cap cosa greu, però on sí que es pauten alguns motius de consulta. Són els següents:

[GotaVerdaPle] A un/a llevador/llevadora o metge/ssa en cas de:

[GotaVerdaBuit] Canvis de pes importants

[GotaVerdaBuit] Canvis en les característiques del flux vaginal (mala olor, picor, coïssor, dolor...)

[GotaVerdaBuit] Diarrea intensa

[GotaVerdaBuit] Dificultat respiratòria

[GotaVerdaBuit] Erupcions a la pell

[GotaVerdaBuit] Febre

[GotaVerdaBuit] Mal de cap no habitual

[GotaVerdaBuit] Després d'una caiguda

[GotaVerdaBuit] Inflor en un lloc diferent als peus o turmells a la tarda o bé si no desapareix amb el descans nocturn

[GotaVerdaBuit] Mareig amb sudoració, augment dels batecs i sensació de desmai

[GotaVerdaBuit] Molèsties urinàries (dolor, coïssor, cremor i/o necessitat d'anar molt sovint a orinar

Problemes de visió sobtats

[GotaVerdaBuit] Vòmits intensos i/o persistents que no cessen amb el tractament

En definitiva, qualsevol situació pel qual es consultaria igualment en cas que no hi hagués embaràs

[GotaVerdaPle] Motius de consulta urgent:

[GotaVerdaBuit] Absència de la percepció de moviments fetals al llarg d'un dia a partir de la setmana 26 de l'embaràs

[GotaVerdaBuit] Contraccions rítmiques i progressivament més intenses abans de la setmana 37. Segons ens indica la Laia Casadevall les contraccions uterines existeixen des del primer dia, fins i tot quan no estem embarassades, i és normal i saludable tenir-les. Si són esporàdiques o irregulars es consideren normals.

[GotaVerdaBuit] Dolor abdominal intens

[GotaVerdaBuit] Febre alta

[GotaVerdaBuit] Mal de cap intens i persistent

[GotaVerdaBuit] Pèrdua de líquid per la vagina que no s'identifiqui com a orina

[GotaVerdaBuit] Pèrdua de sang pels genitals

[GotaVerdaBuit] Tensió arterial elevada que persisteix en un segon control i després de 20 minuts en repòs.

[embarasrecomanacions]

[ficentrareport] [sensesubtitol] [nointext] [embaras00]